

Szczepienie przeciw meningokokom

Meningokoki (*Neisseria meningitidis*) to bakterie, które mogą wywoływać sepsę i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Choroby te rozwijają się gwałtownie i mogą prowadzić do trwałych powikłań (np. niedosłuchu, uszkodzenia mózgu) lub śmierci.

PREPARATY I SCHEMAT SZCZEPIEŃ:

Meningokoki grupy B – Bexsero:

- **3 dawki:** po ukończeniu 8 tygodnia życia, 2 dawki w 1. roku życia (min. 2 miesiące odstępu) + dawka przypominająca w 2. roku życia

Meningokoki grupy ACWY – Nimenrix:

- **Niemowlęta w wieku 6 tyg. – 6 mies.:**
2 dawki w pierwszym roku życia (min. 2 miesiące odstępu) + dawka przypominająca w 2. roku życia
- **Niemowlęta w wieku 6-12 mies.:**
1 dawka w pierwszym roku życia + dawka przypominająca w 2. roku życia
- **Dzieci po 12. miesiącu życia:** tylko 1 dawka szczepionki

ZALETY SZCZEPIENIA:

- Ochrona przed najgroźniejszymi typami meningokoków.
- Zmniejszenie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, powikłań oraz zgonu.

Szczepienie przeciw pneumokokom

(zmiana bezpłatnego preparatu Synflorix na Prevenar 13 lub 20)

Pneumokoki (*Streptococcus pneumoniae*) to bakterie, które mogą wywoływać zapalenie płuc, ucha środkowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz sepsę.

PREPARATY I SCHEMAT SZCZEPIEŃ:

Prevenar 13 - zgodny z kalendarzem obowiązkowym - 2 dawki podstawowe w 1. roku życia w odstępie 2 miesięcy + dawka przypominająca w 13-14. miesiącu życia

Prevenar 20 – 3 dawki podstawowe w 1. roku życia w odstępie 1 miesiąca + dawka przypominająca w 13-14. miesiącu życia

Dlaczego warto wybrać Prevenar 13 lub 20?

Szczepienie preparatem Synflorix zapewnia odporność na 10 serotypów pneumokoków, natomiast Prevenar 13 chroni przez 13 serotypami, a Prevenar 20 odpowiednio przed 20.

Działania niepożądane szczepień dodatkowych

Częste działania niepożądane:

- Zaczerwienienie, obrzęk, ból w miejscu wkłucia.
- Gorączka – szczególnie częsta po szczepieniu Bexsero (może wymagać podania leków przeciwgorączkowych).
- Rozdrażnienie, senność, brak apetytu.

Szczepienie przeciw ospie wietrznej

Ospa wietrzna to choroba wirusowa wywoływana przez wirus Varicella-Zoster. Objawia się gorączką i swędzącą wysypką, ale może prowadzić do ciężkich powikłań, takich jak zapalenie płuc, mózgu czy zakażenia bakteryjne skóry.

PREPARAT I SCHEMAT SZCZEPIEŃ:

Varilrix - 2 dawki w odstępie 6 tygodni po ukończeniu 9 miesiąca życia; w przypadku dzieci uczęszczających do żłobka szczepienie jest bezpłatne po okazaniu zaświadczenia o uczęszczaniu do placówki

ZALETY SZCZEPIENIA:

- Ochrona przed chorobą i jej powikłaniami.
- Redukcja ryzyka półpaśca w przyszłości.

Rzadziej występujące reakcje:

- Po szczepieniu **Varilrix**: wysypka przypominająca ospę wietrzną, zwykle pojawiająca się po 10-14 dniach od szczepienia.
- Niewielki obrzęk węzłów chłonnych.

Jeśli dziecko gorączkuje lub pojawiają się nietypowe objawy, skonsultuj się z lekarzem!